

www.detkityumen.ru

Онлайн конференция с главным педиатром г. Тюмени на "Детках!" 25 апреля 2012 г.

25 апреля 2012г. на портале "Детки!" состоялась он-лайн конференция с главным педиатром города, специалистом Департамента здравоохранения Администрации города Тюмени Надеждой Владимировной Казакевич, которая рассказала посетителям сайта о вакцинопрофилактике, современных вакцинах и методах вакцинации детей.

[Он-лайн конференция](#) организована управлением по здравоохранению Администрации г. Тюмени и порталом "Детки!".

ВОПРОС Muzzy </p><p> Подскажите, если первая вакцинация от гепатита В была в роддоме (потом сильная долгая желтуха), потом в 3 месяца, а после этого прививка не ставилась в связи с временным неврологическим медотводом, то нужно проводить вакцинацию заново или продолжать с учетом уже поставленного по какой-то особой схеме? Сейчас сыну 1,5 года. Спасибо.

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Ваш сын получил два тура вакцинации против гепатита В. В данном случае вакцинация против гепатита В считается незавершенной, необходимо определение антител для решения вопроса о формировании иммунитета или введении полного 3-х кратного курса вакцины.

ВОПРОС Козерожка</p><p> Здравствуйте! Хотелось бы узнать о различии отечественной и импортной вакцине. Почему все-таки предпочтение отдают зарубежной иммуновакцинации?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

В принципе многие вакцины отечественного и импортного производства близки по антигенной структуре, различие - в стабилизаторах.</p><p> Некоторые вакцины имеют разный антигенный состав, такие как Инфанрикс и АКДС - вакцина.</p><p> Следует отметить, что все вакцины производятся по определенной технологии в особых условиях. Выпуск тщательно контролируется как в России, так и зарубежом.</p><p> По вопросу предпочтения вакцин импортного производства, могу сказать, что, как правило, данные вакцины являются комбинированными. Например такие как Пентаксим и Приорикс.</p><p> Некоторые вакцины просто не производятся в России – Имовакс, Инфанрикс, Пневомо23, Превенар. и т.д.

ВОПРОС Igranatal У меня конкретно про вакцину инфанрикс (акдс), педиатр предложил на выбор либо ее, либо отечественную. До этого времени ставили пентаксим (могу ошибиться в написании), т.к. был диагноз ВПС, на данный момент он снят, "неврологии" нет. А я выбрать не могу, что лучше? Не хочется навредить малышу.

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Вашему ребенку после введения вакцины Пентаксим, при отсутствии заболеваний, возможно введение вакцины как АКДС-вакцины, так Инфанрикса. Вам следует проконсультироваться с Вашим педиатром.

ВОПРОС Альчик Надежда Владимировна, у моей дочери бронхиальная астма, (когда то мы стояли у Вас на учете). Ремиссия уже лет 6. Какие прививки ей можно ставить ?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Если у ребенка бронхиальная астма, крайне необходима вакцинация против пневмококковой инфекции, против гриппа и против гемофильной инфекции.

ВОПРОС Альчик

А если она болеет очень редко, один раз в год, все равно нужны прививки от гриппа, ребенку 13 лет?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

При бронхиальной астме при отсутствии обострений любая тяжелая вирусная инфекция (грипп и пневмония) вызывают манифестацию – новые приступы астмы. Помните об этом.

ВОПРОС nezhenka Добрый день! Есть ли какая то статистика по поствакцинальным осложнениям у детей по Тюменской области?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Вся статистика по осложнениям и нежелательным явлениям, возникшим в период после вакцинации отслеживается Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области. Во всех случаях осложнений и выявленных проводится расследование.

ВОПРОС chistya Здравствуйте! Если у ребенка истинная аллергия на куриный белок (фадиатоп (не знаю правильно ли написала) показал 2 при пороге 1,3) и на городской комиссии поставили мед.отвод от всех прививок на курином эмрионе, есть какой-то вариант другой вариант (или другие вакцины)?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

При истинной аллергии на куриный белок все вакцины необходимо вводить с осторожностью только по решению аллерголога.

ВОПРОС Гостя Здравствуйте! Нужно ли прививать ребенка против клещевого энцефалита? С какого возраста? Где и в какое время суток (при укусе клеща) можно сделать экстренную профилактику? Какая вакцина лучше и какова её стоимость? Спасибо!

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Если Вы с ребенком постоянно выезжаете в лес, на рыбалку или охоту или живете в лесной зоне, Вашему малышу показана вакцинация. Существующие вакцины рекомендованы с разного возраста, в зависимости от страны производителя. Например, Джуниор - с 6 месяцев, Энцевир детский - с 1 года. Для введения противоклещевого иммуноглобулина необходимо обращаться в детский травмпункт Областной клинической больницы № 2, по адресу ул. Мельникайте 75, работает круглосуточно. По вопросу выбора вакцины Вы можете проконсультироваться с педиатром. Стоимость варьируется от 400 до 1500 рублей в зависимости от вакцины.

ВОПРОС Еya Добрый день, подскажите пожалуйста, когда появится в поликлиниках БЕСПЛАТНАЯ вакцина Пентаксим? В январе звонила в Департамент здравоохранения ТО и мне сказали, что идут торги и вакцина будет в марте. На дворе конец апреля, а вакцины до сих пор нет. Телефон ответственного за вакцинопрофилактику 46-05-01 (Если ошиблась, то 46-01-05) молчит уже две недели, в приемной не могут сказать почему. Городской департамент вообще ничего не говорит на этот счет, как будто это военная тайна.

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

В настоящее время вакцина Пентаксим поступила в муниципальные поликлиники города.

ВОПРОС Гостя Здравствуйте! Я недавно родила, и все прививки у нас впереди, хотелось бы узнать нужно ли ребенку ставить прививки Пневмо-23, и Акт-хИБ(просто они от таких распространенных болезней в наше время), если да то в каком возрасте, и по какой схеме? Заранее спасибо.

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Все дети города вакцинируются в соответствии с Национальным календарем Российской Федерации и региональной программой вакцинации Тюменской области. Ваш врач педиатр расскажет, с каких прививок нужно начинать прививаться, а вакцинация против гемофильной инфекции и пневмококковой инфекции детям необходимы.

ВОПРОС Solanix Здравствуйте! Верны ли суждения, что прививки способствуют развитию аллергии у предрасположенных к ней детей, насколько достоверно, что снижение иммунитета вероятно в целом, т.е. от определенных болезней прививка защищает, но при этом ребенок начинает болеть чаще, к примеру ОРЗ? И, последний вопрос, существует ли прививка от ВЕТРЯНКИ и когда её нужно делать, а также какие противопоказания она имеет? Заранее спасибо.

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Вопросы манифестации атопического дерматита, связанной с началом вакцинации, особенно обсуждаются аллергологами и педиатрами. Действительно, введение любого белкового агента у ребенка с атопией вызывает наработку антител, и может сопровождаться появлением высыпаний.</p></p></div>

Для исключения формирования аллергического заболевания дети должны быть осмотрены и обследованы.</p></p></div>

ВОПРОС СВЕТУЛЯ</p></p></div>

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Здравствуйте ! У моего ребенка с рождения стоит диагноз гидронефроз обеих почек, наблюдаемся в Патрушево, каждые пол-года делаем УЗИ и контрольный прием уролога, в нашей детской поликлинике (по месту жительства) обязаны нам выдавать путевку-направление на прием и УЗИ , для того, чтобы данные обследования мы проходили бесплатно ???</p></p></div>

ВОПРОС anuta8141</p></p></div>

После выписки нам назначили: Наринэ, Мультабс, Деринат, Элеутрокок

Через месяц у нас стали щеки красные,я подумала, что может у нас от витаминов.Перестали принимать,но все равно через день могут щеки покраснеть,откуда у нас диатез? И диатез это,надо нам сходить к иммунологу,как считаете?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Действительно, Ваш ребенок перенес повторные инфекционные заболевания. После череды инфекционных заболеваний ребенку показана консультация аллерголога-иммунолога для определения тактики ведения и разработки плана реабилитации.

ВОПРОС fafa Здравствуйте, моей дочери 4мес. В 1месяц у нас обнаружили ИМВП. После долгого лечения врач поставил "ремиссия". Но теперь доча заболела ветрянкой и ИМВП присоединилась. Когда можно будет ставить прививки? И еще у на до 5месяцев медотвод по неврологии (диагноз ППЦНС).

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Крайне неприятное сочетание у Вашей малышки - ветряная оспа в 4 месяца и повторная инфекция мочевыводящих путей. В данном случае, вакцинация не показана в течение месяца после выздоровления, и конечно необходим контрольное исследование анализа мочи через месяц и только потом вакцинация.

ВОПРОС Ирочка3323 Здравствуйте! Ребенку 6 мес., родились 21 октября 2011 г. В род. доме поставили БЦЖ, от гепатита я написала отказ. В 1 мес. поставили гепатит В, в 2 мес. мы заболели ОРВИ и вторую прививку решили отложить до 3 мес. Когда поставили вторую прививку врач нам сказала что третью прививку нужно будет ставить в мае, т.е. через 3 мес. В 5 мес. поставили первую АКДС (пентаксим). Когда были на приеме у невролога, она сказала что нужно ставить третью прививку против гепатита В в 6 мес. т.е. в апреле, а вторую АКДС (пентаксим) в 7 мес., т.е. в мае. Хотела бы узнать у Вас когда все таки нам ставить третью прививку против гепатита В и можно ли ставить вторую АКДС (пентаксим) по истечении более 45 дней? Большое спасибо за ответ. offl

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

В России вакцинация против гепатита В принята по схеме 0-3-6, если схема вакцинации изменена, то между вторым и третьим туром вакцинации должно быть 3 месяца перерыва. Возможна одновременная вакцинация - введение Пентаксима и вакцины против гепатита В, Допускается удлинение промежутков между турами введения вакцины Пентаксим.

ВОПРОС M@gnolia Здравствуйте. У меня несколько вопроосов. 1. Правомерно ли то, что с меня как с родителя брали отказ от прививок, хотя у нас был медотвод от невропатолога? 2. Является ли прививка от Гепатита В обязательной? 3. Если ли прививка от менингита? 4. С какого возраста можно прививать детей от клещевого энцефалита? 5. Является ли аллергическим проявлением покраснение и уплотнение около 3 см в месте вакцинации Пентаксимом? 6. Если моему сыну поставили БЦЖ-М в 3 месяца когда мы должны делать манту? в год? или через год? 7. Когда у нас будут проводить диагностику туберкулезной болезни ДИАСКИНТЕСТом?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

1. На любое медицинское вмешательство, включая вакцинацию, требуется официальное согласие родителей, даже при временном медицинском отводе. 2. Прививка от гепатита В внесена в Национальный календарь и является обязательной для граждан Российской Федерации. 3. Существует вакцина от менингококковой инфекции. 4. Существующие вакцины рекомендованы с разного возраста, в зависимости от страны производителя с 6 месяцев - Джуниор, Энцевир детский - с 1 года. 5. На введение вакцины Пентаксим допускается местная реакция с гиперемией до 6 см в диаметре. 6. Туберкулинодиагностика (реакция Манту) проводится ежегодно 1 раз в год начиная с возраста 1 год. 7. Вопросы внедрения новых технологий, включая Диаскентест, находится в ведомственном подчинении Департамента здравоохранения Тюменской области.

ВОПРОС тигра </p><p> Добрый день! Дочери в роддоме на вторые сутки посталена прививка БЦЖ. НА чнетвертые сутки (рождения) поднималась температура 39,8 лежали с диагнозом ОРЗ в ОПН.</p><p> Рубца от привики у дочери не осталось. После реакции Манту нас каждый раз направляют на консультацию к фтизиатру по результатам замеров.</p><p> На сколько я понимаю прививка на фоне ОРЗ "не прижилась"? В каком возрасте лучше всего повторить попытку? и Является ли отсутствие руубца от БЦЖ признаком того что человек стерилен от туберкулеза?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Ревакцинация против туберкулеза показана в 6 лет. Отсутствие рубца свидетельствует об отсутствии наработки антител от микробактерий.

ВОПРОС Ева72 </p><p> Здравствуйте! моей доченьки 2,8 мес, пол года назад я заметила у нее увеличенные шейные лимфоузлы, посоветовалась с нашим педиатром что делать, мне она сказала что это нормально увеличенные лимфоузлы у деток до 7 лет! Действительно ли это считается нормой? Т.к. две маленькие шишечки на шее у дочери до сих пор.. может нужно какое то обследование? Благодарю вас, если ответите.

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Увеличение лимфоузлов у детей признак лимфоаденопатии, возможна реакция на внедрение вируса или формирование защиты. В любом случае показана консультация педиатра и стоматолога.

ВОПРОС Гостя </p><p> Добрый день!</p><p> 1. Эффективна ли прививка от гриппа для ребенка 3-х лет? Интересуют все вакцины от гриппа и в частности Ваксигрипп. Действительно ли она уменьшает количество и обычных простудных заболеваний? Ребенок посещает детский сад.</p><p> 2. Позволит ли прививка от пневмококка (Пневмо-23, Превенар) уменьшить количество простудных заболеваний для ребенка 3-х лет? (Особых показаний от врача, чтобы ставить эту прививку, у нашего ребенка нет.) Действительно ли бывают случаи, когда после данной прививки дети начинают болеть чаще?</p><p> 3. Какие прививки стоит ставить детям помимо входящих в Национальный календарь прививок и в каком возрасте?</p><p> (От ветрянки мы уже поставили Окавакс, по возрасту ставили 3 прививки пентаксим (с компонентом от гемофильной инфекции)).</p><p> Благодарю за ответы!

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Для ребенка, посещающего детский сад, вакцинация от гриппа эффективна, особенно в сочетании с вакцинацией против пневмококковой инфекции.</p><p> Дополнительно к Национальному календарю дети вакцинируются от ветряной оспы, пневмококковой инфекции, вируса папилломы человека, начиная с 10 лет (девочки), против гепатита А - с 6 лет, клещевого энцефалита - с 1 года или 6 месяцев.

ВОПРОС СветланаККа Добрый день. Каким кефиром порекомендуете прикармливать ребенка 8 месяцев. Раньше брали на молочной кухне, чем сейчас можно заменить? Аналогичный вопрос по творогу, планирую вводить позже. Спасибо за ответ.

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Детям с 8 месяцев показан кефир для детского питания. Его можно купить в магазине в промышленной упаковке. Творог для детей без аллергических проявлений показан с 5 месяцев. Его также можно купить в магазинах в промышленной упаковке или сделать самим из кефира (1 стакан кефира нагреть и дать стечь через марлю или мелкое сито). Ребенку от 5 до 12 месяцев нужно 30г. творога и 200 г. (1 стакан) кефира.

ВОПРОС тигра В интернете ходят слухи о том, что наша область входит в экспериментальную программу по введению пневмококковой прививки (Акт-Хиб и пневмо 23). То есть, люди говорят, что на наших детях тестируются эти вакцины. Сможете ли Вы развеять такие слухи или подтвердить? Я сама поддавшись на уговоры педиатра, поставила в 2,2г ребенку Акт-хиб (За 2 года болели 3 раза) . После прививки на следующий день поднялась температура, сопли, прицепилась инфекция...через неделю мы попали в нейроинфекцию с лакунарной ангиной и т.д....В общем ребенку 4,5 и за последние два года я не помню ее здоровой...бесконечные ангины, скарлатина, орз.... Случайность? Или есть связь с вакцинацией Акт-Хибом? Ведется ли какая-то статистика по таким вот совпадениям?

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

В нашей области возможность привить ребенка против гемофильной (Акт-Хиб) и пневмококковой (Пневмо-23) инфекции, появилась значительно раньше, чем в других областях Российской Федерации. Во всем мире, включая Францию, Германию, США и Италию, данной вакциной прививаются, начиная с 1993 года. В этих странах, благодаря вакцинации, отсутствуют группы часто болеющих детей и дети, посещают детский сад с 1-1,5 года. Скарлатина – это самостоятельное инфекционное заболевание, повторная ангина, скорее всего, связана с носительством стрептококка. В Вашем случае необходима консультация иммунолога и кардиолога.

ВОПРОС eXidna-ket Надежда Владимировна у меня вопросов к вам нет, просто я хочу сказать вам большое спасибо за то что вы есть !!! Вы всегда внимательно выслушиваете и помогаете чем можете. Мы с мужем обращались к вам несколько раз (наблюдаемся в 17 поликлинике) всегда все вопросы решались, Спасибо вам ещё раз от нас обоих!

ОТВЕТ Н.В. Казакевич

Спасибо Вам за доброе отношение и внимание. Я, действительно, всегда готова разобраться в каждой ситуации. Рада буду помочь по различным вопросам. Мой телефон 45-21-47.

Адрес на сайте «Детки!» www.detkityumen.ru/interesno/category73/1433/